Höyük yüzeyinde rastlanan çakıllı, silisli ve mikalı hamurlu, siyah, gri hamurlu ve perdahlı seramik parçalarıTroia Höyük'ün 11.lV ve V. tabakalarındaki buluntularla benzerlik içindedir. M.Ö. 2200-1900'e tarihlenen seramik örnekleri özlü, killi, mikalı hamurlu olup renginde kırmızı ve kahverengi hakimiyeti vardır.

Rastlanan kaseler, pithoslar, testiler ve tabaklar arasında demir çağına uzanan M.Ö. 1000 yılına kadar kesintisiz bir yerleşimin gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

KURŞUNLU VE ÇEVRESİNDEKİ ŞİFALI SULAR

Kurşunlu ve çevresi şifalı sular bakımından çok zengindir. Beldeye uzaklıkları 5 km.'yi geçmeyen Çitli, Kınık, Bakmaca, Öksürük Suyu, Çayköy, Maden Suyu Kurşunlu'nun mücavir alanları içindedir. Ayrı ayrı özelliklere sahip bu şifalı suların ayrıntılarıyla ele alalım.

ÇİTLİ MADEN SUYU : Kurşunlunun 5 km. güney batısında ana asfaltın 1 km. güneyinde yer alır. İnegöl'e uzaklığı 10 km.'dir. Çitli tepelerinin eteğinde ağaçlık bir vadidedir. Saf, berrak, ekşimsi ve lezzetli içimli bikarbonatlı sofra suyudur. 1862 Anghelos Ridiger Çitli Maden Suyunun işletmeciliğini 10 yıllığına alarak tüm dünyada tanınmasını sağlamıştır. 1881'de işletme hakkı eczacı George Dellesuda'ya geçti. Zamanın Bursa Valisi Ahmet Vefik Paşa bu imtiyaza Bursa Hastanesini de ortak etmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın sonunda düşman orduları bölgeden geçerken kaynaklarla tesisatı bomba ile yıkmışlardır. Günümüzde işletmeci olmadığından bakımsız harabe vaziyetinde bulunmaktadır. Hazım bozukluklarına iyi gelen 9 altın madalyalı Çitli Maden Suyunun analiz raporu şöyledir.

İYONLAR

Karbon	384
Karbonitsoda	605.4
Potasyumkarbon	241
maknezyum	563
karbonitkilis	763
karbonithadid	500
karbonitsu	231
Fosfatsoda	16
Klor	66
Silis	060

KINIK MADEN SUYU : Kurşunlunun 4 km. güneyinde mezit deresinin kıyısında 1953 yılında kurulmuş bir işletmedir. 1972'de Rafet ARIÇ tesisleri kiralayıp Masit A.Ş. kurdu. Günden güne modernleşerek günümüzde Türkiye'nin her yerine şişelenmiş olarak maden suyu pazarlanmaktadır. Kansızlık, hazımsızlık beslenme bozukluklarına karşı faydalı bir su olup suyun 1973 yılındaki tahlil raporu şöyledir. 1 litrede sodyum 475.171 mgr, kalsiyum 180.000 mgr, magnezyum 134.400mgr, demir, aliminyum 139.619 mgr. Cilt temizliğine de iyi gelen suyun bulunduğu alan tabiat güzellikleri yönünden de önemlidir.

BAKMACA SUYU: Kurşunlu'nun 5 km. güney doğusundadır. Göçük Dağlarının eteklerinde orman içindedir. Ekşimsi lezzette, rengsiz, kokusuz, gazlı ve bikarbonatlı bir su olup kaynağında şiddetli köpürmeler vardır. Suyun çıktığı yerde 30 cm. uzaklıktaki yanan bir mumu söndürdüğü kaynaklarda belirtilir. Hazmı kolaylaştırır. (Hamiz-i Fehm Gazı) mide, bağırsak, idrar yolu, karaciğer hastalıkları ve kaşıntılara karşı faydalıdır.

Tesisatı yoktur. Kurşunlu Belediyesi tarafından duş kabinleri yapılmıştır. Yolu bozuk stablize olduğundan istenilen ziyaretçi sayısına ulaşılamamıştır. Kaynağın verimi iyi olup travertenlerden aşağı süzülüp akar. Bakmaca suyu ile ilgili ilk araştırmayı Fransız Be'ral yapmıştır. Bu su hakkında Bursa Vilayeti Salnamesi ve Eski Osmanlı Gazetesinde bilgiye rastlanmıştır. Suyun analizi Bongovski'ye göre şöyledir:

Sıcaklık : 26 C
-15 C de izafi sıkleti : 1.0035
Serbest asid karbonik : 0.5659
Bicarmonite de soude : 2.0211
Bicarmonite de calcium : 0.9182
Bicarmonite de magnezium : 0.0112
Bicarmonite de fer : 0.0091
Chlorure de sodium : 0.0637
Bicarmonite de potassium : 0.1081
Silice : 0.2700
Manganese : trace
Total : 3.9675





ÖKSÜRÜK SUYU : Bakmaca Yolu üzerinde Özlüce Köyünün hemen üstünde Göçük Dağı eteğindedir. Kurşunlunun güneyindeki bu su guatır başta olmak üzere mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelir. Tesisi yoktur. Boşta akar. Özellikle Ramazan ayında İnegöl ve çevresinde gelen insanların uğrak yeridir.

ÇAYKÖY MADEN SUYU : Kurşunlunun doğusunda Cehennem deresi ile Çayköy deresinin birleştiği yere yakındır. Yolun olmaması ve çevrede fazla tanınmaması bu güzel suyun dereye boş yere akıp gitmesine neden olur.

Sindirim bozukluklarına mide hastalıklarına iyi gelir. Yaz aylarında derenin suyu kesildiği halde maden suyu devamlı akar. Bu yüzden deredeki asit miktarı arttığından balıkların üreme açısından olumsuz etki yapar.